

ویژگی‌های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی

ایرج اله دادی^۱ - حسین اورکی^{۲*} - فتنه پرهیزکار خاجانی^۳

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۱/۲۰

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۱/۲۹

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر تنش کمبود آب بر ویژگی‌های فیزیکی دانه ارقام آفتابگردان، آزمایشی روی چهار رقم آذرگل، آلتستار، هایسان ۳۳ و هایسان ۲۵ در سه سطح آبیاری (پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) اجرا گردید. نمونه گیری تصادفی در پایان فصل رشد و بر اساس ۱۳ درصد رطوبت دانه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین طول، عرض و ضخامت دانه در رژیم آبیاری بعد از ۵۰ میلی‌متر تبخیر به دست آمد و تیمارهای مواجهه با تنش کم آبی (آبیاری محدود بعد از ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر تبخیر) به ترتیب باعث کاهش ۱۵ و ۲۴ درصد طول، ۱۸ و ۳۵ درصد عرض و ۱۷ و ۳۰ درصد ضخامت دانه گردیدند. بنابراین عرض دانه در مقایسه با طول و ضخامت دانه حساسیت بیشتری به سطوح تنش کمبود آب داشت. در بین ارقام مورد مطالعه بیشترین طول، عرض و ضخامت دانه متعلق به رقم آلتستار بود. همچنین در تمام سطوح آبیاری رقم آلتستار دارای بیشترین وزن دانه بود که از این لحاظ در آبیاری نرمال (پس از ۵۰ میلی‌متر تبخیر) با رقم هایسان ۲۵ اختلاف معنی‌داری نداشت. بنابراین رقم زودرس آلتستار در شرایط آبیاری نرمال و محدود از نظر وزن و ویژگی‌های فیزیکی دانه تحمل بیشتری به شرایط کم‌آبی داشته است.

واژه‌های کلیدی: آفتابگردان، پوست دانه، تنش کم آبی، مغز دانه، ویژگی‌های فیزیکی

مقدمه

(2002)، کشت این گیاه به اراضی دیم و نیمه خشک دنیا تمایل یافته است. بنابراین تنش خشکی یا کم‌آبی یک عامل محدود کننده برای گیاه آفتابگردان می‌باشد و در گزارش‌های مختلفی به تاثیر تنش کم‌آبی و آبیاری محدود بر آفتابگردان از بسیاری جنبه‌ها از جمله صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و فیزیولوژیک اشاره شده است (Angadi and Entz, 2002; Daneshyan, 2002; Daneshyan et al., 2006; Erdem et al., 2006; Rafie et al., 2005; Goksoy et al., 2004; Kiani et al., 2007; Khani et al., 2005). با این حال تحقیقات محدودی درباره ویژگی‌های فیزیکی دانه اکثر گیاهان زراعی از جمله آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی انجام شده است. با توجه به برنامه توسعه رشد دانه‌های روغنی و به‌ویژه آفتابگردان در آینده، فقدان اطلاعات علمی کافی مربوط به ویژگی‌های فیزیکی دانه آفتابگردان و استفاده نامناسب از تجهیزات منجر به کاهش کارایی و افزایش خسارت و ضایعات در طی مراحل کاشت، داشت، برداشت و فراوری می‌شود، بنابراین ویژگی‌های فیزیکی بذرهای از جمله صفات مهم و تاثیر گذار در طراحی بسیاری از ماشین‌های کشاورزی می‌باشند، لذا دسترسی به اطلاعات علمی پایه در رابطه با ویژگی‌های فیزیکی که نقش مهمی را در طراحی تجهیزات مورد نیاز کاشت، داشت، برداشت، انتقال، انبارداری و فرایند محصول ایفا می‌کنند، ضروری به نظر می‌رسد (Gupta and Das, 1997). درصد پوست دانه تحت اثر رقم و اثر متقابل تنش و رقم قرار می‌گیرد در حالی که تنش اثر معنی‌داری بر میزان پوست دانه

آفتابگردان (*Helianthus annuus* L.) یکی از مهم‌ترین محصولات روغنی در جهان می‌باشد (Flagella et al, 2002). بخش عمده دانه‌های این گیاه را که فندقه نامیده می‌شود، روغن تشکیل می‌دهد (Seiler, 1997). مقدار روغن در ارقام مختلف آفتابگردان بسیار متغیر بوده (۵۰-۴۰ درصد) و تا به حال بهترین‌گران تلاش‌های بسیاری را برای افزایش میزان آن انجام داده اند (Lopez et al., 2000; Leon et al., 2003; Monotti, 2004). با توجه به رشد سریع جمعیت، دستیابی به منابع غذایی سالم و کافی یکی از چالش‌های ضروری بسیاری از کشورها برای تحقق امنیت غذایی در جامعه است.

دانه‌های روغنی پس از غلات، دومین منبع غذایی اصلی در جهان به شمار می‌آیند. با توجه به این که کم‌آبی مهم‌ترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در جهان می‌باشد (Flexas et al., 2004; Lawlor, 2002) و آفتابگردان یک محصول زراعی متحمل به خشکی با سیستم ریشه‌ای عمیق است (Angadi and Entz,

۱ و ۳- به ترتیب دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

۲- دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

*-نویسنده مسئول: (Email: oraki.hussein@gmail.com)

مواد و روش ها

این تحقیق در سال ۱۳۸۸ به صورت یک آزمایش زراعی در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا گردید. محل اجرای آزمایش در ارتفاع ۱۰۵۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته و دارای زمستان ملایم و تابستان گرم و خشک می باشد. متوسط میزان بارندگی سالیانه در منطقه بیش از ۱۰۰ میلی متر و میزان تبخیر سالانه ۲۰۰۰ میلی متر می باشد. خاک محل آزمایش دارای بافت لومی رسی، وزن مخصوص ظاهری ۱/۶۳ گرم بر سانتی متر مکعب، میزان هدایت الکتریکی آن ۱/۸ دسی زیمنس بر متر و میانگین اسیدیته خاک تا عمق ۸۰ سانتی متری حدود ۷/۸ بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این تحقیق شامل چهار رقم آفتابگردان (یک رقم بومی و سه رقم جدید وارداتی) (جدول ۱) و سه سطح آبیاری (پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) بود. سطوح آبیاری که به ترتیب معرف آبیاری مناسب، تنش کمبود آب متوسط و تنش کمبود آب شدید بود در کرت های اصلی و ارقام آفتابگردان در کرت های فرعی قرار داده شدند. تیمار آبیاری مناسب پس از ۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A از زمان کاشت تا پایان دوره رشد گیاه اعمال شد و زمان اعمال تیمارهای آبیاری محدود به ترتیب پس از ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی براساس روش پیشنهادی Chimenti and Hall (1993) پس از استقرار گیاه در مرحله ۶ تا ۸ برگی در کرت های آزمایشی بود. میزان تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A نصب شده در ایستگاه هواشناسی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به طور روزانه اندازه گیری شد.

برای تهیه زمین ابتدا یک شخم نیمه عمیق با گاواهن برگردان دار و بعد از آن دو نوبت دیسک عمود بر هم زده شد. سپس با نمونه برداری از خاک و بر اساس توصیه مؤسسه خاک و آب، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر از منبع فسفات آمونیوم قبل از کاشت و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع فسفات آمونیوم و اوره (در دو مرحله، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار در مرحله ۶ تا ۸ برگی) در زمین پخش شد و توسط فاروئر جوی و پشته روی زمین ایجاد گردید. تاریخ کاشت برای تمام ارقام همزمان و در ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ انجام شد. تاریخ برداشت برای هر رقم در شرایط مختلف آبیاری متفاوت بود و براساس زمان رسیدن محصول در هر یک از واحدهای آزمایشی انجام شد. هر واحد آزمایشی دارای چهار خط کاشت به طول پنج متر و با فاصله ۶۵ سانتی متر از یکدیگر بود. فاصله بوته ها روی خطوط کاشت ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شد. همچنین فاصله بین تکرارها سه متر تعیین گردید. در زمان رسیدگی فیزیولوژیک از هر کرت آزمایشی

نمی گذارد و این صفت بسیار کمتر از عملکرد و وزن هزار دانه تحت تأثیر خشکی قرار می گیرد (Nel^(a), 2001). در این رابطه در تحقیقاتی مشخص شد که طول دانه و درصد پوست آن بیشتر از عرض و ضخامت دانه تحت تاثیر ارقام آفتابگردان قرار می گیرد (Nel^(b), 2001). همچنین مطالعات نشان داده است اندازه بذره های آفتابگردان همبستگی مثبتی با حجم و جرم دانه دارند (Alexander et al., 2001). بررسی ها نشان داده که ویژگی های فیزیکی دانه مانند اندازه آن همبستگی کمی با برخی از پارامترهای کیفی دانه (درصد روغن و پروتئین دانه) دارد (Baldini and Vannozzi, 1996; Nel^(b), 2001). یکی از عوامل موثر در زمینه افزایش عملکرد گیاه آفتابگردان، وزن و ویژگی های فیزیکی دانه ها می باشد که در این میان وزن دانه ها در شرایط کم آبی نسبت به تعداد دانه در گیاه کمتر تحت تأثیر تنش قرار می گیرد (Daneshyan et al., 2006; Flagella et al., 2002). بررسی های انجام شده توسط برخی محققین مؤید این مطلب است که تنش خشکی وزن دانه آفتابگردان را کاهش می دهد (Daneshyan et al., 2006; Rafie et al., 2005). یافته های (Daneshyan et al., 2006) نیز حاکی از کاهش ۳۹ درصدی وزن دانه در شرایط تنش کم آبی می باشد. (Akbari et al., 2009) اعلام کردند تیمارهای آبیاری محدود بعد از ۱۲۰ و ۱۸۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A به ترتیب باعث کاهش ۱۱ و ۱۶ درصد طول، ۲۱ و ۲۶ درصد عرض و ۲۲ و ۲۸ درصد ضخامت دانه می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه ضخامت دانه در مقایسه با عرض و طول دانه حساسیت بیشتری به سطوح آبیاری محدود داشت.

با توجه به اهمیت زراعت آفتابگردان به عنوان یکی از نباتات عمده صنعتی برای تولید روغن خوراکی در جهان، در صورت توسعه آن در کشور سبب گسترش اشتغال فعال و مولد در صنایع روغن کشی و روغن نباتی و بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی و جلوگیری از واردات بی رویه روغن و کنجاله خواهد شد. در ایران سطح زیر کشت آفتابگردان در سال زراعی ۸۹-۸۸ در حدود ۳۰۰۰ هکتار با میانگین عملکرد ۹۵۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. از آنجا که به دلیل تحمل قابل توجه آفتابگردان به تنش های رطوبتی زراعت این گیاه به اراضی دارای آبیاری محدود و دیم سوق داده شده است، شناسایی واکنش ویژگی های فیزیکی دانه ارقام مختلف آن به تنش کمبود آب ضروری است. بدیهی است نتایج چنین تحقیقاتی به عنوان یک راهبرد علمی و کاربردی برای تسهیل در مراحل طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی مورد نیاز با کارایی بالا و در نهایت افزایش تولید محصول در این گونه اراضی به کار گرفته خواهد شد (Akbari et al., 2009). بنابراین ارزیابی اثر تنش کم آبی بر ویژگی های فیزیکی و عملکرد دانه چهار رقم آفتابگردان به عنوان هدف اصلی این پژوهش در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث

ابعاد دانه (طول، عرض و ضخامت)

نتایج این آزمایش نشان داد که ابعاد فیزیکی دانه به طور معنی داری ($P \leq 0.01$) تحت تاثیر شرایط تنش کمبود آب قرار گرفت (جدول ۲ و ۳). با اعمال شرایط تنش کمبود آب شدید (۱۵۰ میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A)، طول، عرض و ضخامت دانه ارقام آفتابگردان به ترتیب دستخوش ۲۴، ۳۵ و ۳۰ درصد کاهش در مقایسه با شرایط آبیاری نرمال شدند (جدول ۴). با توجه به نتایج بدست آمده ویژگی‌های عرض و ضخامت نسبت به طول دانه حساسیت بیشتری به شرایط تنش کمبود آب دارند و با شدت بیشتری کاهش می‌یابند که در این مورد حساسیت عرض دانه بیش از ضخامت آن می‌باشد. کاهش شدید عرض و ضخامت دانه می‌تواند به دلیل کاهش سنتز مواد فتوسنتزی و در نتیجه اختلال در پر شدن دانه‌ها تحت شرایط تنش رطوبتی باشد که این موضوع باعث تولید دانه‌هایی لاغر و چروکیده شده است. همچنین با توجه به نتایج مقایسه میانگین‌ها به نظر می‌رسد طول دانه در ارقام آفتابگردان بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار دارد و به همین دلیل در شرایط تنش کمبود آب، کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. در تحقیقات دیگر نیز تاثیر کاهش تنش کمبود آب بر بسیاری از ویژگی‌های فیزیکی دانه مانند طول، عرض و ضخامت به اثبات رسیده است (Baldini and Vannozzi, 1996).

بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر رقم بر ابعاد دانه در سطح ۱ درصد معنی‌دار بود (جدول ۲). با توجه به مقایسه میانگین‌ها مشخص گردید رقم آلستار دارای بیشترین طول، عرض و ضخامت دانه می‌باشد (جدول ۴).

شش طبق به طور تصادفی برداشت گردید و دانه‌ها از طبق‌ها جدا شدند. ارزیابی طول، عرض و ضخامت دانه‌ها طبق روش (Lindstrom et al. 2006) انجام گردید، به طوری که از طبق‌های هر کرت ۲۰ دانه به طور تصادفی انتخاب و سه بعد اصلی دانه‌ها شامل طول، عرض و ضخامت آن‌ها به وسیله کولیس با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. برای به دست آوردن وزن پوسته‌ها نیز بر اساس روش (Lindstrom et al. 2006) از دانه‌های برداشت شده هر واحد آزمایشی ۳۰ دانه انتخاب شد و پوست از مغز آن‌ها جدا گردید، سپس وزن پوست و وزن مغز دانه به طور جداگانه با ترازوی دیجیتالی با دقت ± 0.001 گرم تعیین شد. برای ارزیابی وزن تک‌دانه نیز پس از توزین دو نمونه ۱۰۰ عددی از هر کرت، میانگین نمونه‌ها به عنوان وزن تک دانه هر کرت در نظر گرفته شد. برای محاسبه قطر هندسی (D_g) و حجم دانه (V) به ترتیب از روش‌های (Mohsenin (1986) (Jain and Bal (1997) (رابطه ۱) استفاده شد.

$$D_g = (LWT)^{\frac{1}{3}} \quad (1)$$

$$V = 0.25 \left[\left(\frac{\pi}{6} \right) L(W+T)^2 \right] \quad (2)$$

که در آن L ، T و W به ترتیب طول، عرض و ضخامت بذر بر حسب میلی‌متر می‌باشند. در این تحقیق برای دانه، طول، عرض، ضخامت، حجم و وزن، علاوه بر وزن پوست، وزن مغز و نسبت پوست به دانه اندازه‌گیری شد. در نهایت کلیه ضرایب همبستگی بین صفات محاسبه شد، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از برنامه آماری SAS و MSTATC و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد استفاده گردید.

جدول ۱- ویژگی‌های رشدی ارقام مورد آزمایش.

Table 1. Growth properties of the studied cultivars.

تایپ رشدی	طول دوره رشد (روز)	طول دوره پر شدن دانه (روز)	مبدأ	رقم	شماره
Type of growth	During growing period (Day)	During the grain filling period (Day)	Habitat	Variety	Number
دیررس	115.6	54.4	ایران	آزرگل	1
Late maturing			Iran	Azargol	
زودرس	91.2	33.1	فرانسه	آلستار ^۱	2
Early maturing			France	Alstar	
دیررس	109.8	45.6	استرالیا	هایسان ^{۲۳۳}	3
Late maturing			Australia	Hysun 33	
زودرس	95.3	38.4	استرالیا	هایسان ^{۲۲۵}	4
Early maturing			Australia	Hysun 25	

1- Alestar

2- Hysun 33

3- Hysun 25

جدول ۲- تجزیه واریانس میانگین مربعات طول، عرض، ضخامت و قطر هندسی دانه چهار رقم آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب.
Table 2. Analysis of variance for length, width, thickness and geometric diameter of grain in four Sunflower cultivars under water deficit conditions.

قطر هندسی (mm ³) Geometric diameter	ضخامت (mm) Thickness	عرض (mm) Width	طول (mm) Length	درجه آزادی Degree of freedom	منابع تغییرات Source of variation
0.01 ^{ns}	0.29*	2.71*	2.46*	2	تکرار Repeat
11.50**	4.12**	15.04**	23.64**	2	آبیاری Irrigation
0.02	0.04	0.23	0.15	4	خطای کرت اصلی Main plot error
0.80**	3.71**	5.12**	16.31**	3	رقم Variety
0.18*	0.13*	0.73*	0.63*	6	آبیاری × رقم Irrigation × Variety
0.05	0.03	0.23	0.23	18	خطای کرت فرعی Subplot error
4.29	6.17	9.39	4.98	---	ضریب تغییرات Coefficient of variation

* و ** به ترتیب معنی دار در سطوح ۵ درصد و ۱ درصد و ns غیر معنی داری.

* = p < 0.05, ** = p < 0.01, ns = non-significant

قطر هندسی، حجم، وزن پوست، وزن مغز و نسبت پوست به دانه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر رقم بر صفات قطر هندسی، حجم، وزن پوست، وزن مغز و نسبت پوست به دانه در سطح ۱ درصد معنی دار است (جدول ۲ و ۳). بررسی میانگین صفات مورد آزمایش در این بخش تحت تاثیر تیمارهای آبیاری نشان داد بیشترین میزان این صفات در تیمار آبیاری مناسب (پس از ۵۰ میلی متر تبخیر) بدست آمد (جدول ۴). همچنین با توجه به مقایسه میانگین ها مشخص گردید که رقم زودرس آلتار بیشترین میزان صفات قطر هندسی، حجم، وزن پوست و نسبت پوست به دانه را کسب کرد، اما رقم آذرگل بعنوان یک رقم دیررس موفق به کسب بیشترین میزان وزن مغز شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص گردید رقم آذرگل از لحاظ ویژگی های فیزیکی دانه دارای پوستی نازک و مغز درشت می باشد و این ویژگی ها در مجموع باعث می شوند که میزان بیشتری از عملکرد دانه این گیاه به مغز آن که بخش پراهمیت در صنعت روغن می باشد اختصاص یابد. همچنین کمترین میزان صفات قطر هندسی، حجم، وزن پوست و وزن مغز در رقم متوسط رس هایسان ۳۳ مشاهده شد و کمترین میزان نسبت پوست به دانه مربوط به رقم آذرگل بود.

بررسی میانگین اثرات برهمکنش آبیاری × رقم (جدول ۵) نشان داد در تیمار آبیاری مناسب بین ارقام از نظر صفات قطر هندسی، وزن پوست، وزن مغز و نسبت پوست به دانه اختلاف وجود دارد. رقم آلتار بیشترین میزان صفات قطر هندسی، وزن پوست و وزن مغز را دارا بود اما از نظر صفت نسبت پوست به دانه تفاوت محسوسی بین ارقام

در آزمایش انجام شده توسط Nel-b (2001) نیز تفاوت معنی داری از نظر ویژگی های فیزیکی دانه (طول، عرض و ضخامت) در بین ارقام آفتابگردان گزارش شده است. در این پژوهش اثرات برهمکنش آبیاری × رقم روی طول، عرض و ضخامت در سطح ۵ درصد معنی دار شد (جدول ۲).

مقایسه میانگین های صفات مورد بررسی تحت تاثیر برهمکنش آبیاری × رقم در جدول ۵ نشان می دهد که ارقام آذرگل و آلتار در شرایط آبیاری مناسب بیشترین طول دانه را داشتند، این در حالی است که طول دانه ارقام آذرگل و آلتار در تیمار آبیاری پس از ۱۵۰ میلی متر تبخیر به ترتیب ۲۶ و ۱۵ درصد کاهش یافت. با توجه به نتایج بدست آمده رقم آلتار از نظر صفت طول دانه حساسیت کمتری به شرایط تنش کمبود آب دارد. همچنین رقم آلتار در تمام سطوح آبیاری بیشترین میزان عرض دانه را به خود اختصاص داد که این نیز نشان دهنده تحمل بالای این رقم به شرایط تنش کمبود آب و محدودیت در آبیاری می باشد. همچنین لازم به ذکر است که در این آزمایش نسبت عرض به طول دانه محاسبه شد و مشخص گردید که با افزایش تنش کمبود آب مقدار این صفت کاهش می یابد بطوری که مقدار این صفت در شرایط آبیاری مناسب ۰/۵۶ و در شرایط تنش شدید کمبود آب ۰/۴۸ بود و این نشان دهنده ۱۴ درصد کاهش در این صفت می باشد. همچنین در بین ارقام مورد بررسی بیشترین میزان نسبت عرض به طول دانه متعلق به رقم هایسان ۲۵ بود که این ویژگی نشان دهنده عریض و قطور بودن دانه این رقم آفتابگردان می باشد.

وزن مغز دانه نشان داد رقم آذرگل بالاترین میزان را در تمام شرایط آبیاری کسب کرده بود، بطوری که حداکثر میزان وزن مغز (۰/۰۵۸۱۶ گرم) را در شرایط تنش متوسط بدست آورد. این در حالی است که کمترین میزان وزن مغز دانه در شرایط تنش کمبود آب شدید و توسط رقم هایسان ۳۳ بعنوان رقم متوسط رس بدست آمد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۱ و همچنین نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثر تیمارها بر این صفت، به نظر می‌رسد بالاتر بودن دوره پر شدن دانه در رقم دیررس آذرگل و سرعت پر شدن بالا در رقم زودرس آلتار در افزایش بیشتر وزن مغز ارقام نامبرده دخیل بوده است، (Lopez et al. (2000 نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابهی دست یافتند. البته در این مورد عوامل ژنتیکی گیاه مانند مکان‌های ژنی منتقل کننده صفات کمی (QTL) نیز می‌تواند دخیل باشد (Tang et al., 2006). میزان پوست دانه در گیاه آفتابگردان ۲۶-۲۰ درصد وزن خشک کل دانه را تشکیل می‌دهد (Hernandez and Belles, 2007). از نظر نسبت پوست به دانه در شرایط تنش کمبود آب متوسط و شدید رقم آلتار به دلیل وزن پوسته بالا و وزن مغز دانه پایین حائز بیشترین میزان بود (جدول ۵). بنابراین می‌توان گفت ارقام زودرس آفتابگردان در شرایط متفاوت آبیاری دارای بیشترین وزن پوست دانه و نسبت پوست به دانه بودند در حالی که از نظر وزن مغز دانه ارقام دیررس می‌توانند برتر از سایر ارقام زودرس مورد بررسی در این پژوهش باشند.

آذرگل، هایسان ۳۳ و آلتار مشاهده نشد. با این وجود میزان این صفت برای رقم آلتار (۲۶/۴۲ درصد) بیشتر از دیگر ارقام مورد بررسی بود. در شرایط تنش کمبود آب متوسط و شدید رقم زودرس آلتار بیشترین میزان صفات قطر هندسی، وزن پوست و نسبت پوست به دانه را کسب کرد این در حالی بود که رقم دیررس آذرگل دارای بیشترین میزان وزن مغز بود. رقم زودرس هایسان ۲۵ از نظر صفات مورد بررسی همانند رقم آلتار بود و در رتبه دوم قرار داشت. رقم آلتار در شرایط تنش کمبود آب متوسط و شدید در رابطه با قطر هندسی دانه بترتیب ۱۵ و ۱۹ درصد کاهش داشت و از این لحاظ کمترین حساسیت به شرایط نامناسب رطوبتی را نشان داد، همچنین هایسان ۳۳ نیز با ۲۰ و ۳۷ درصد کاهش قطر هندسی تحت شرایط تنش کمبود آب متوسط و شدید دارای بیشترین حساسیت به شرایط تنش کمبود آب بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفت حجم دانه نشان داد این صفت بطور معنی‌دار و در سطح ۱ درصد تحت تاثیر سطوح آبیاری و رقم قرار گرفت (جدول ۳).

بر اساس بررسی میانگین‌ها مشخص گردید بالاترین میزان حجم دانه (۱۵/۷۰۴ میلی‌متر مکعب) در ارقام آفتابگردان تحت شرایط آبیاری مناسب بدست آمد. همچنین در بین ارقام مورد بررسی، رقم آلتار بیشترین میزان حجم دانه (۱۴۸/۵۴۳ میلی‌متر مکعب) را کسب کرد. لازم به ذکر است که کمترین میزان حجم دانه در تیمارهای آبیاری برای شرایط تنش کمبود آب شدید و در بین ارقام مورد بررسی برای رقم متوسط رس هایسان ۳۳ بدست آمد. بررسی‌ها در مورد صفت

جدول ۳- تجزیه واریانس میانگین مربعات برخی ویژگی‌های فیزیکی دانه چهار رقم آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب

Table 3. Analysis of variance for some physical characteristics of grain in four Sunflower cultivars under water deficit conditions

نسبت پوست به دانه (%) Husk to grain ratio	وزن مغز (g) Kernel weight	وزن پوست (g) Husk weight	وزن دانه (g) Grain weight	حجم (mm ³) Volume	درجه آزادی Degree of freedom	منابع تغییرات Source of variation
8.84*	0.0000059*	1.31 ^{ns}	0.0000078 ^{ns}	75 ^{ns}	2	تکرار Repeat
59.99**	0.0000076**	3.69*	0.00058**	29688**	3	آبیاری Irrigation
0.01	0.00000057	0.00000032	0.00000078	86	4	خطای کرت اصلی Main plot error
184.56**	0.00033**	0.00015**	0.00027**	11219**	3	رقم Variety
89.67**	0.000036**	0.000042**	0.000035**	179 ^{ns}	6	آبیاری × رقم Irrigation × Variety
1.90	0.0000016	0.00000035	0.0000042	272	18	خطای کرت فرعی Subplot error
5.29	2.56	3.42	3.114	16.74	---	ضریب تغییرات Coefficient of variation

* و ** به ترتیب معنی دار در سطوح ۵ درصد و ۱ درصد و ns غیر معنی داری.

* = p < 0.05, ** = p < 0.01, ns = non-significant

بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان گفت تحت شرایط تنش کمبود آب بسته به ویژگی های رشدی رقم مورد بررسی ممکن است نسبت پوست به دانه افزایش و یا کاهش پیدا کند بطوری که این صفت تحت شرایط تنش کمبود آب برای ارقام زودرس مورد بررسی در این پژوهش (آلستار و هایسان ۲۵) افزایشی اما برای ارقام دیررس آذرگل و متوسط رس هایسان ۳۳ کاهش می تواند. بنابراین می توان نتیجه گرفت نسبت پوست به دانه در ارقام آفتابگردان صفتی وابسته به ژنتیک می باشد که شرایط رطوبتی نیز می تواند روی آن تاثیر گذار باشد.

وزن دانه

نتایج تجزیه واریانس صفت وزن دانه نشان داد، این صفت بطور معنی دار ($P \leq 0.01$) تحت تاثیر رقم آفتابگردان، سطوح آبیاری و برهمکنش آبیاری × رقم قرار داشت (جدول ۳). بر این اساس بیشترین و کمترین میزان این صفت به ترتیب در تیمارهای آبیاری مناسب و تنش کمبود آب شدید (به ترتیب پس از ۵۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A) حاصل شد (جدول ۴). همچنین رقم آلستار دارای بیشترین میزان وزن دانه بود و ارقام آذرگل، هایسان ۲۵ و هایسان ۳۳ بترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند (جدول ۴). با توجه به نتایج مندرج در جدول مقایسه میانگین اثرات برهمکنش آبیاری × رقم مشخص شد در شرایط آبیاری مناسب بین ارقام آلستار، آذرگل و هایسان ۲۵ از نظر وزن دانه تفاوت معنی دار وجود ندارد، با این وجود رقم زودرس آلستار دارای برتری نسبی

در شرایط تنش کمبود آب بوده. در شرایط آبیاری محدود (تنش کمبود آب متوسط و شدید) رقم زودرس آلستار بالاترین میزان وزن دانه را به خود اختصاص داد و از این لحاظ با دیگر ارقام مورد بررسی تفاوت معنی دار داشت (جدول ۵). همچنین رقم آذرگل به عنوان رقم دیررس از نظر داشتن میزان وزن دانه بالا در رتبه دوم قرار داشت (جدول ۵). بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش رقم متوسط رس هایسان ۳۳ دارای کمترین میزان وزن دانه در تیمارهای آبیاری محدود بود. بررسی های انجام شده نشان داد سرعت پرشدن دانه بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ قرار دارد و بین سرعت پرشدن دانه و مدت پرشدن آن رابطه معکوسی وجود دارد (Hashemi and Marashi, 1995). بر اساس نتایج بدست آمده و اطلاعات مندرج در جدول ۱ رقم زودرس آلستار با وجود داشتن کوتاه ترین دوره پرشدن دانه (۳۳/۱ روز) در مقایسه با سایر ارقام مورد بررسی موفق به کسب بالاترین میزان وزن دانه شد (جدول ۱ و ۴). نتایج بدست آمده از تحقیقات قبلی نشان می دهد ارقام آفتابگردانی که دوره فعال پرشدن دانه آنها کوتاه است سرعت پرشدن دانه و سرعت رشد دانه بالاتری دارند که با یافته های تحقیق حاضر هم خوانی دارند (Akbari et al., 2009; Francisco Gimenez and et al., 1996). بر اساس نتایج حاصل از پژوهش Fereres (1986) نسبت به ارقام دیررس کسب کردند. همچنین رقم دیررس آذرگل به دلیل داشتن بالاترین طول دوره پرشدن دانه (۵۴/۴ روز) از لحاظ وزن دانه در رتبه دوم پس از آلستار قرار داشت.

جدول ۴- میانگین صفات اندازه گیری شده در ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب

Table 4. Means for measured traits in Sunflower cultivars under water deficit stress conditions.

نسبت پوست به دانه (%) Husk to grain ratio	وزن مغز (g) Kernel weight	وزن پوست (g) Husk weight	وزن دانه (g) Grain weight	حجم (mm ³) Volume	قطر هندسی (mm) Geometric diameter	ضخامت (mm) Thickness	عرض (mm) Width	طول (mm) Length	تیمار Treatment
28.63a	0.051a	0.017a	0.072a	152.70a	6.43a	3.83a	6.28a	11.26a	50
25.33b	0.050b	0.016b	0.065b	88.14b	5.35b	3.17b	5.14b	9.51b	100
24.37c	0.046c	0.017ab	0.059c	54.88c	4.47c	2.67c	4.04c	8.48c	150
22.08d	0.056a	0.014c	0.06b	80.40c	5.06c	2.76c	4.413c	10.75a	آذرگل Azargol
32.53a	0.051b	0.023a	0.07a	148.54a	6.40a	3.93a	6.05a	11.06a	آلستار Alstar
24.16c	0.044c	0.014c	0.05c	68.40c	4.71d	2.61c	4.67c	8.68b	هایسان ۳۳ Hysun33
25.67b	0.044c	0.016b	0.06b	96.94b	5.49b	3.60b	5.49b	8.50b	هایسان ۲۵ Hysun25

اعداد هر ستون در هر گروه که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت آماری معنی داری در سطح احتمال پنج درصد می باشند.
a, b, c, d Within columns, means followed by the same letters are not significantly different ($P < 0.05$).

جدول ۵- میانگین اثرات برهمکنش آبیاری × ارقام آفتابگردان برای صفات اندازه‌گیری شده

Table 5. Means of interaction of water deficit stress × Sunflower cultivars for measured traits.

نسبت پوست به دانه (%) Husk to grain ratio	وزن مغز (g) Kernel weight	وزن پوست (g) Husk weight	وزن دانه (g) Grain weight	قطر هندسی (mm) Geometric diameter	ضخامت (mm) Thickness	عرض (mm) Width	طول (mm) Length	رقم Variety	آبیاری Irrigation
24.50cd	0.056ab	0.01766e	0.072abc	6.23bc	3.33cd	5.76a	12.73a	آزرگل Azargol	50
26.42c	0.051c	0.02000c	0.075a	7.28a	4.82a	6.59a	12.16a	الستار Alstar	
24.30cd	0.049d	0.001683ef	0.069bcd	5.87cde	3.11de	6.27a	10.47bc	هایسان ۳۳ Hysun33	
22.27d	0.047e	0.01653fg	0.074ab	6.32b	4.08b	6.52a	9.68cd	هایسان ۲۵ Hysun25	
24.54cd	0.058a	0.01564gh	0.063ef	5.08f	2.88ef	4.48b	10.16bcd	آزرگل Azargol	100
29.56b	0.050cd	0.02133b	0.072abc	6.12bcd	3.59c	5.91a	10.82b	الستار Alstar	
24.17cd	0.047e	0.01420i	0.058g	4.63g	2.59f	4.42b	8.68ef	هایسان ۳۳ Hysun33	
23.06d	0.044f	0.01541h	0.066de	5.57e	3.62c	5.73a	8.38f	هایسان ۲۵ Hysun25	
17.20e	0.056b	0.01067j	0.062fg	3.86h	2.06g	2.98d	9.37de	آزرگل Azargol	150
41.63a	0.051c	0.02837a	0.068cde	5.80de	3.37cd	5.66a	10.22bcd	الستار Alstar	
24.01cd	0.035h	0.01133j	0.047h	3.63h	2.12g	3.32cd	6.90g	هایسان ۳۳ Hysun33	
30.70b	0.041g	0.01859d	0.058g	4.59g	3.11de	4.21bc	7.44g	هایسان ۲۵ Hysun25	

اعداد هر ستون در هر گروه که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت آماری معنی داری در سطح احتمال پنج درصد می باشند.
a, b, c, d, e, f, g, h Within columns, means followed by the same letters are not significantly different ($P < 0.05$).

جدول ۶- ضرایب همبستگی میان صفات اندازه‌گیری شده در ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب.

Table 6. Correlation coefficients between measured traits of sunflower cultivars under water deficit stress conditions.

حجم Volume	قطر هندسی Geometric diameter	وزن مغز دانه Kernel weight	وزن پوست دانه Husk weight	وزن تک دانه Single grain weight	ضخامت Thickness	عرض Width	طول Length	صفت Trait
							0.63*	عرض Width
						0.88**	0.55	ضخامت Thickness
					0.81**	0.86**	0.82**	وزن تک دانه Single grain weight
				0.52	0.56	0.58*	0.42	وزن پوست دانه Husk weight
			0.21	0.57*	0.13	0.19	0.77**	وزن مغز دانه Kernel weight
		0.36	*0.60	0.92**	0.93**	0.95**	0.78**	قطر هندسی Geometric diameter
	0.98**	0.33	0.54	0.89**	0.92**	0.91**	0.78**	حجم Volume
0.18	0.24	-0.06	0.90**	0.10	0.25	0.25	0.06	پوست/دانه

* و ** به ترتیب معنی دار در سطوح ۵درصد و ۱درصد.
* = $p < 0.05$ and ** = $p < 0.01$

لاغر و چروکیده شد. همچنین مشخص گردید طول دانه بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ قرار دارد و وابستگی کمتری به شرایط رطوبتی محیط دارد. کاهش وزن دانه در شرایط تنش کم آبی بیشتر به دلیل کاهش صفات قطر هندسی، حجم دانه، طول و عرض دانه بود و کمتر وابسته به صفت ضخامت دانه بود. در مجموع رقم آلتار حائز بیشترین میزان ویژگی های طول، عرض، ضخامت دانه و وزن دانه در شرایط تنش کم آبی شد که این نشان دهنده تحمل بیشتر این رقم به شرایط نامناسب رطوبتی می باشد. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش توصیه می شود که در مناطق کم آب و در سیستم های کشت دیم از رقم مقاوم آلتار استفاده گردد، زیرا با توجه به نتایج بدست آمده رقم آلتار قدرت تولید عملکرد بالاتری در شرایط تنش کمبود آب دارد و در صورت مواجه شدن با شرایط کمبود آب نسبت به سایر ارقام مورد بررسی خسارت کمتری متحمل می شود.

در این پژوهش بیشترین همبستگی موجود بین وزن دانه و ابعاد و ویژگی های فیزیکی دانه به ترتیب با قطر هندسی ($r=0/92$)، حجم دانه ($r=0/89$)، عرض ($r=0/86$)، طول ($r=0/82$) و ضخامت ($r=0/80$) بوده است که نشان دهنده پراهمیت تر بودن صفات قطر هندسی، حجم دانه و عرض دانه نسبت به طول و ضخامت آن در افزایش وزن تک دانه می باشد (جدول ۶).

نتیجه گیری

ویژگی های فیزیکی دانه در ارقام آفتابگردان تحت تاثیر نوع ارقام و شرایط رطوبتی حاکم بر مزرعه قرار می گیرد، بطوری که با اعمال تنش کم آبی ابعاد فیزیکی دانه ارقام آفتابگردان کاهش آشکاری نشان دادند. کاهش شدیدتر عرض و ضخامت دانه نسبت به طول آن به دلیل ایجاد اختلال در فرایند فتوسنتز و انتقال مواد فتوسنتزی به سمت دانه در شرایط تنش کمبود آب می باشد که باعث تولید دانه های

منابع

- 1- Akbari, G.A., H., Jabari, J., Daneshyan, E. alah dadi, and N. Shahbaziyan. 2009. Effect of limited irrigation on physical properties of sunflower seed hybrids. Journal of Science and technology of Agriculture and natural Resource, 12 (45). (In Farsi).
- 2- Alexander, H. M., C. L., Cumings, L. Kahn, and A. A. Snow. 2001. Seed size variation and predation of seeds produced by wild and crop-wild sunflowers. American. J. of Botany 88, 623-627.
- 3- Angadi, S. V. and M. H. Entz. 2002. Root system and water use patterns of different height sunflower cultivars. Agron. J, 94, 136-145.
- 4- Baldini, M. and G. Vannozzi. 1996. Crop management practice and environmental effects on hullability in sunflower hybrids. Helia, 19, 47-62.
- 5- Chimenti, C. A. and A. J. Hall. 1993. Genetic variation and changes with ontogeny of osmotic adjustment in sunflower (*Helianthus annuus* L.). Euphytica, 71, 201-210.
- 6- Daneshyan, J. 2002. Selection of tolerant lines of sunflower water deficit (final report). Seed and Plant Improvement Institute in Karaj, Iran. Research Department oilseeds. (In Farsi).
- 7- Daneshyan, J., H. Jabari, and A. farokhi, 2006. Effect of water deficit and plant density on yield and agronomic characteristics of sunflower cultivation in the second culture. 9th Iranian congress of crop science and plant breeding, University of Tehran, college of Aboureihan, Pakdasht, iran. (In Farsi).
- 8- Erdem, T., Y., Erdem, A. H. Orta, and H. Okursoy. 2006. Use of a crop water stress index for scheduling the irrigation of sunflower (*Helianthus annuus* L.). Turk. J. Agric. For, 30, 11-20.
- 9- Flagella, Z. T., Rutunno, E., Tarantino Dicaterina, R. and De Caro, A. 2002. Changes in seed yield and oil fatty acid composition of high oleic sunflower hybrids in relation to the sowing date and the water regime. European Journal of Agron, 17, 331-334.
- 10- Flexas, J., J., Bota, F., Loreto, G. Cornic, and T. D. Sharkey, 2004. Diffusive and metabolic limitations to photosynthesis under drought and salinity in C3 plants. Plant Biol, 6, 269-279.
- 11- Francisco, J.V., A.J., Hall, J.I. Ritchie, and F. Organs. 1996. A development growth and yield model of sunflower crop. Agron. J, 88, 403-415.
- 12- Gimenez, C. and Fereres, E. 1986. Genetic variability in sunflower cultivars under drought. II-Growth and water relations. Aust. J. Agric. Res, 37, 583-597.
- 13- Goksoy, A. T., A. O., Demir, Z. M. Turan, and N. Dagustu. 2004. Responses of sunflower to full and limited irrigation at different growth stages. Field Crops Res, 87, 167-178.
- 14- Gupta, R. K. and Das, S. K. 1997. Physical properties of sunflower seeds. Journal of Agricultural

- Engineering Research, 66, 1-8.
- 15-Hashemi, D. A. and Marashi, E. 1995. Changes in photosynthetic rate at the time of flowering and its effect on grain growth, grain yield performance of wheat. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 9 (2), 16-32.
- 16-Hernandez, L. F. and Belles, P. M. 2007. A 3-D finite element analysis of the sunflower (*Helianthus annuus* L.) fruit. Biomechanical approach for the improvement of its hull ability. *J. of Food Eng*, 78, 861-869.
- 17-Jain, R.K. and Bal, S. 1997. Properties of pearl millrt. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 66, 85-91.
- 18-Khani, M., J., Daneshyan, K. H. Zinali, and M. Ghanadha. 2005. Genetic analysis of yield and its components in sunflower lines using the line × tester crosses plan under stress and without stress. *Iranian Journal of Crop Science*, 36 (2), 435-445. (In Farsi).
- 19-Kiani, P. S., P., Grieu, P., Hewezi, L. Gentsbittel, and A. Sarrafi, 2007. Genetic variability for physiological traits under drought conditions and differential expression of water stress-associated genes in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Theor. Appl. Genet*, 114, 193-207.
- 20-Lawlor, D. M. 2002. Limitation to photosynthesis in water-stressed leaves: stomata vs. metabolism and the role of ATP. *Ann. Bot*, 89, 871-885.
- 21-Leon, A. J., F. H. Andrade, and M. Lee, 2003. Genetic analysis of seed-oil concentrations across generations and environments in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Crop Sci*, 43, 135-140.
- 22-Lindstrom, L. I., C. N., Pellegrini, L. A. N. Aguirrezabal, and L. F. Hernandez. 2006. Growth and development of sunflower fruits under shade during pre and early post-anthesis period. *Field Crops Res*, 96, 151-159.
- 23-Lopez Pereira, M., N. Trapani, and V. Sadras. 2000. Genetic improvement of sunflower in Argentina between 1930 and 1995. III. Dry matter partitioning and achene composition. *Field Crops Res*, 67, 215-221.
- 24-Mohsenin, N.N. 1986. *Physical Properties of Plant and Animal Materials*. (2nd Ed). Gordon and Breach Science Publishers, New York.
- 25-Monotti, M. 2004. Growing non-food sunflower in dry land conditions. *Ital J Agron*, 8, 3-8.
- 26-Nel, A. A. 2001 ^(a). Effect of water stress during grain filling on seed yield and quality. Chapter 7, University of Pretoria.
- 27-Nel, A. A. 2001 ^(b). Relationship between seed quality and easily measurable seed characteristics. Chapter 8, University of Pretoria.
- 28-Rafie, F., E., Kashani, R. Mamghani, and A. Golchin. 2005. Effect of irrigation and nitrogen stages on performance and some morphological characteristics of sunflower hybrids(Glshyd). *Iranian Journal Of Crop Science*, 1 (7), 44-53. (In Farsi).
- 29-Seiler, G. J. 1997. Anatomy and morphology of sunflower. In: A. A. Schneiter (Ed.), *Sunflower Technology and Production*. PP. 67-111., Monograph No. 35. ASA, CSSA, SSSA, Madison, Wisconsin, U.S.A.
- 30-Tang, S., A., Leon, W. C. Bridges and S. J. Knappa. 2006. Quantitative trait loci for genetically correlated seed traits are tightly linked to branching and pericarp pigment loci in sunflower. *Crop Sci*, 46, 721-734.